

¿Qué es la gonorrea?

- La gonorrea es una infección que puede afectar a la vagina, el pene, el ano o la garganta.
- Muchas personas con gonorrea no muestran señales o síntomas de la infección.
- Cuando los síntomas están presentes, estos pueden ser leves al principio.

Usted podría presentar algunos de los siguientes síntomas:

- Dolor o ardor al orinar
- Flujo de olor o apariencia extraños en la vagina, el pene o el ano
- Sangrado en la vagina durante o después de las relaciones sexuales
- Dolor o cosquilleo en el pene
- Dolor abdominal o en la espalda, particularmente durante las relaciones sexuales (las mujeres)
- Fiebre

¿Es grave la gonorrea?

Si lo es, y de no recibir tratamiento, usted:

- Enfrentaría la posibilidad de no poder quedar embarazada o tener bebés en el futuro.
- Podría transmitir la gonorrea a otras personas con las que tenga relaciones sexuales.
- Podría transmitirla a su bebé durante el parto.
- Podría experimentar dolores abdominales durante las relaciones sexuales durante meses o incluso años (las mujeres).
- Podría experimentar dolor e inflamación de sus testículos.
- Podría causarle embarazos extra uterinos, con riesgo de muerte.
- Puede propagarse a la sangre y a las articulaciones.
- Tendría más susceptibilidad a infectarse con otras enfermedades, como el VIH.

¿Cómo me infecté con gonorrea?

- Usted la contrajo al tener relaciones sexuales vaginales, anales u orales con alguien que ya la tenía.
- La mayoría de las personas no saben que están infectada y es imposible saberlo con solo mirar a la persona.
- La única manera de saber si usted se ha infectado es hacerse las pruebas.

¿Qué debo hacer ahora?

La gonorrea se cura fácilmente si usted sigue los siguientes tres pasos:

1. Tómese toda la medicina que su doctor o la enfermera le receten.
2. Asegúrese de que **TODAS** sus parejas sexuales de los últimos dos meses obtengan tratamiento para la gonorrea lo antes posible.
3. No tenga relaciones sexuales hasta que hayan transcurrido **SIETE DÍAS** desde que usted y su(s) pareja(s) sexual(es) terminaron el tratamiento.
→ Si tuviera relaciones sexuales antes de los siete días, utilice un condón.

Si no siguiera todos los pasos anteriores, usted podría REINFECTARSE de gonorrea, con efectos aún más graves.

Muchas personas que se infectan con gonorrea VUELVEN A REINFECTARSE:

Hágase la prueba nuevamente en TRES meses.

- El haber contraído gonorrea **NO** confiere inmunidad contra la reinfección posterior.
- La reinfección con gonorrea es bastante común.
- La reinfección con gonorrea puede causarle daños aún mayores en su cuerpo.
- En la mayoría de los casos, no se presentan síntomas debido a la reinfección con gonorrea.
- Es fundamental que regrese y se haga la prueba de nuevo a los tres meses.

Recuerde: Es muy importante que:

- Regrese a la clínica si sus síntomas no desaparecen en pocos días.
- Utilice un condón cada vez que tenga relaciones sexuales para que no se reinfecte con gonorrea.

Gonorrea

¿Qué debo saber sobre mi tratamiento?

NO TENGA RELACIONES SEXUALES HASTA SIETE DÍAS DESPUÉS DE QUE USTED Y SU(S) PAREJA(S) SEXUAL(ES) HAYAN TERMINADO EL TRATAMIENTO.

Se le ha entregado la medicina marcada a continuación:

- Cefixima** (Cefixime) **Cefpodoxima** (Cefpodoxime)

Tómese toda esta medicina de una sola vez tan pronto se la den.

- Ceftriaxona** (Ceftriaxone) (administrada por inyección en la clínica)

Y, también le pueden haber dado:

- Azitromicina** (Azithromycin)

Tómese toda esta medicina de una sola vez tan pronto se la den.

- Doxiciclina** (Doxycycline)

- Tómese UNA píldora en la mañana y otra por la noche durante SIETE días.
- NO tome esta medicina si cree que pueda estar embarazada o si está amamantando.
- Si esta medicina le molestara el estómago, tómela con los alimentos o con leche.
- Esta medicina puede causarle susceptibilidad a las quemaduras de sol.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de este tratamiento?

Llame inmediatamente al 911 si presentara alguno de los siguientes problemas:

- Resuellos (jadeos)
- Dificultad para respirar

Llame a la clínica si presentara alguno de los siguientes síntomas:

- Sarpullido o protuberancias en la piel
- Picazón

¿QUÉ SUCEDE SI ESTOY EMBARAZADA?

- Si cree que está embarazada, dígaselo a su doctor o enfermera antes de tomar cualquier medicina.
- Dígale al médico que le da atención prenatal que el resultado de la prueba indica que es positiva para gonorrea.
- Si va a continuar con su embarazo, será preciso que se haga nuevamente las pruebas para gonorrea en **tres o cuatro semanas más**. Esto se hace para garantizar que ya esté curada.
- Si usted no recibiera tratamiento para la gonorrea, puede contagiar a su bebé durante el parto. Esto puede causarle serias infecciones en los ojos, las articulaciones o en la sangre a su bebé.

¿Qué hay de mi(s) pareja(s) sexual(es)?

Hay muchas maneras de lograr que su(s) pareja(s) sexual(es) reciban tratamiento para la gonorrea: A continuación se mencionan algunas de ellas:

- Hágase acompañar de su pareja cuando venga a la clínica a recibir tratamiento.
- Pídale a su doctor o enfermera que le den una dosis adicional para llevársela a su(s) pareja(s).
- Pídale a su(s) pareja(a) que visite a su propio médico para recibir tratamiento.
- Visite el sitio web www.inspot.org, desde donde podrá enviar un correo electrónico anónimo a su(s) pareja(s) para informarle(s) que podría(n) tener gonorrea.

¿Qué más necesito saber?

- La gonorrea es una infección de transmisión sexual (ITS) muy común.
- Muchas personas con gonorrea también están infectadas con clamidia.
- Muchas personas con gonorrea no muestran ningún síntoma de la infección.
 - De presentarse, los síntomas pueden aparecer inmediatamente o incluso hasta 30 días después de haber tenido relaciones sexuales con una persona infectada con gonorrea.
- Si usted ya tuvo gonorrea, la probabilidad de reinfectarse es muy alta. La reinfección podría ocurrir si:
 - Tiene relaciones sexuales con alguien que no recibió tratamiento, o...
 - Tiene relaciones sexuales muy pronto después de que usted y su(s) pareja(s) sexual(es) ha(n) completado el tratamiento, o...
 - Tiene relaciones sexuales con una nueva pareja ya infectada.
- Es posible que usted tenga gonorrea y otras ITS simultáneamente.

Partes de este formulario son adaptaciones del documento California Department of Public Health, Office of Family Planning: Gonorrea-What You Need to Know (OF4074), obtenido en <http://www.familypact.org>